

Krankheit	Impfempfehlung	Impfstoff	Gültigkeit	Übertragung	Impfabstände	Impfung
Cholera-Lebend		oraler Lebend-Aktiv-Impfstoff bzw. inaktiverter, ab 2. Lebensjahr	6 Monate, beginnend ab dem 10. Tag nach der Impfung		bisher keine Erfahrungen	1. Impfdosis: 2-6 Wochen 2. Impfdosis: 6 Monate
Cholera-Tot	nur bei Impfpflicht oder besondere Risiken (z. B. mediz. Tätigkeit)	inaktiverter Totimpfstoff (Bakterien)	6 Monate, beginnend ab dem 8. Tag nach der Impfung	fäkal-oral, über kontaminierte Speisen/Getränke	keine	1. Impfung: 1-4 Wochen 2. Impfung: Alter: ab dem 6 Lebensmonat
Diphtherie	generelle Impfempfehlung für alle Länder	Tot-Aktiv-Impfstoff (Toxoid), eine Kombinationsimpfung mit Tetanus ist erhältlich	10 Jahre, Schutz ungefähr ab dem 10. Tag nach der Impfung	Tröpfcheninfektion, Wundinfektion	keine	1. Impfung: Sofort 2. Impfung: 4-6 Wochen nach der Erstimpfung 3. Impfung: 1 Jahr nach der Erstimpfung Danach besteht kompletter Impfschutz.
Gelbfieber	bei Impfpflicht oder Empfehlung im Einreiseland oder bei Einreise aus Infektionsgebieten (abhängig von den Bestimmungen des Einreiselandes), nicht Kinder unter 7 Monaten.	parenteraler attenuierter Lebendvirus Aktiv Impfstoff, Impfung nur in lizenzierten Instituten.	10 Jahre, beginnend ab dem 10. Tag nach der Impfung.	Mücken (Aedes aegypti), stechen tags und nachts.	4 Wochen zu anderen Lebendimpfungen	einmalige Impfung, Alter: ab 7 Monaten
Hepatitis A	Empfehlung für alle Reisenden in tropischen und subtropischen Ländern. Vor der Impfung Antikörperkontrolle im Blut!	HAV-Aktiv-Tot-Impfstoff	10 Jahre, Schutz ungefähr 2-4 Wochen nach der 1. Impfung, 1. Impfung + 5ml Immunglobulin - Schutz nach 10 Tagen	fäkal-oral über kontaminierte Speisen und Getränke	keine	1. Impfung: Zeitgleich mit Diphtherie 2. Impfung: 4-6 Wochen nach Erstimpfung 3. Impfung: 6 Monate nach Erstimpfung Auffrischimpfung: alle 10 Jahre.
Hepatitis B	längere oder häufigere Tropenaufenthalt, Medizin, Sex-Kontakte, Kinder	Aktiv-Tot-Impfstoff mit inaktivierten JBE-Viren	ab dem 10. Tag nach der 2. Impfung	Blut, Sexualkontakte	keine, Alter: ab Neugeborenenalter möglich	1. Impfung: Zeitgleich mit Diphtherie 2. Impfung: 4-6 Wochen nach Erstimpfung 3. Impfung: 6 Monate nach Erstimpfung Auffrischimpfung: alle 10 Jahre.
Japan-B-Encephalitis	WHO: mehr als 1 Monat in ländl. Endemie-Gebieten in den Übertragungszeiten von Mai-Sept.	Aktiv-Tot-Impfstoff	2 Jahre, ab dem 10. Tag nach der 3. Impfung	Mücken	keine Erfahrung mit gleichzeitiger Diphtherie/Tetanus	1. Impfung: 2-4 Wochen 2. Impfung: 1 Jahr 3. Impfung: 2 Jahre keine Erfahrungen mit Kindern unter 1 Jahr

Meningokokken	Langzeitaufenthalte, medizinische u. soziale Berufe	Aktiv-Tot-Impfstoff	2-5 Jahre, beginnend 10 Tage nach der Impfung	Tröpfcheninfektion, Wundinfektion	keine, Alter: ab 18 Monaten	1. Impfung: 2-4 Wochen 2. Impfung: 1 Jahr 3. Impfung: 2 Jahre keine Erfahrungen mit Kindern unter 1 Jahr
Tetanus (Wundstarrkrampf)	generelle Impfempfehlung für alle Länder	Tot-Aktiv-Impfstoff, eine Kombinationsimpfung mit Diphtherie ist erhältlich	10 Jahre, Schutz ungefähr ab dem 10. Tag nach der Impfung.	Wundinfektion	keine	1. Impfung 4-6 Wochen 2. Impfung 1 Jahr 3. Impfung alle 10 Jahre
Tollwut	Impfprophylaxe vor Risiko-Reisen	Aktiv-Tot-Impfstoff	3-5 Jahre, 10 Tage nach der 3. Impfung	vor allem über Biß- oder Kratz-Wunden	keine, Alter: keine Altersbeschränkung	1. Impfung: 1. Woche 2. Impfung: 3. Woche 3. Impfung: 1 Jahr 4. Impfung: 3-5 Jahre
Typhus Typhoral	Impfempfehlung bei Risiken für alle tropischen und subtropischen Länder	Lebend-Aktiv-Impfstoff aus Salmonella typhi	1 Jahr, Schutz ungefähr ab dem 10. Tag nach der Impfung	fäkal-oral, über kontaminierte Speisen/Getränke	3 Tage zu Cholera-Lebendimpfung, Polio kein Abstand	Lebendimpfung nicht bei Antibiotika - Einnahme, Immundefekten, Darminfektionen